

## Употреба

Novalac AC е храна, специално разработена, за да отговори на хранителните нужди на бебета с колики под формата на коремна болка, метеоризъм и подуване на корема поради намалена толерантност към лактоза. Novalac AC има намалено съдържание на лактоза, което ограничава чревната ферментация или появата на коремна болка, метеоризъм и подуване на корема. Novalac AC може да се използва като единствен източник на хранене, докато бебето навърши 6 месеца, ако те не са на майчина кърма. След 6-месечна възраст можете да използвате Novalac AC като част от разнообразна диета, която трябва постепенно да въвеждате съветите на вашия лекар.

## Важна забележка

**Майчиното мляко е най-добрата храна за кърмачета.** Използвайте Novalac AC само под лекарско наблюдение и само при бебета, които проявяват симптомите, за които продуктът е предназначен. Не използвайте продукта като единствен източник на храна след 6-месечна възраст и/или в случай на галактоземия. Когато се използва мляко за кърмачета Novalac AC е необходимо специално внимание при кърмачета с отслабен имунен отговор, недоносени кърмачета и новородени с ниско телесно тегло при раждане и в случай на алергични реакции към белтъците на млякото. Неправилното приготвяне или съхранение може да представлява риск за здравето. Novalac AC не е подходящ за парентерална употреба или за хранене през тръба. Опаковано при контролирани атмосферни условия.

## Дозировка

| Възраст на кърмачето (месеци)             | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-12 | 12-36 |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| Брой хранения на ден                      | 6   | 5   | 5   | 4   | 3*   | 2*    |
| Брой лъжици за приготвяне на едно хранене | 3   | 4   | 5   | 7   | 7    | 8     |
| Количество вода (ml)                      | 90  | 120 | 150 | 210 | 210  | 240   |

\* като част от разнообразното хранене

Пълна догоре и изравнена мерителна лъжичка от опаковката съдържа 4,3 g Novalac AC. Разтворете една лъжица в 30 ml вода. Коригирайте дневния прием на храна и броя хранения спрямо възрастта и нуждите на кърмачето. Освен ако лекарят, не препоръча друго, следвайте препоръките в таблицата.

Винаги пригответе храната непосредствено преди хранене.

• Съхранявайте на сухо място, далеч от топлина и светлина. • Продуктът е годен за употреба преди датата, отпечатана на дъното на металната кутия. • След отваряне съдържанието на кутията трябва да се използва в срок до три седмици. Затваряйте кутията плътно след употреба. • Не използвайте остатъчното количество мляко. Изхвърлете остатъците.

Фирмено седалище: UP Medi-Europa SA, Швейцария • Държава на произход: Германия • Официален представител за България: Медис Фарма България ЕООД, София 1700, ул. „Проф. Атанас Иширков“ 31



MEDIS | www.novalac.bg

# Novalac AC

## Храна за специални медицински цели

За диетотерапия при колики под формата на коремна болка, метеоризъм и подуване на корема



намалено съдържание на лактоза

0-36 месеца

400 g e

## Хранителна стойност

|                                    | 100 g  | 100 ml |
|------------------------------------|--------|--------|
| <b>Енергийна стойност</b>          |        |        |
|                                    | kJ     | 2103   |
|                                    | kcal   | 502    |
|                                    | g      | 25     |
| <b>Мазнини</b>                     |        |        |
| От които                           |        |        |
| - наситени                         | g      | 11,7   |
| - Линолова киселина                | g      | 4,5    |
| - Алфа-линоленова киселина         | mg     | 405    |
| - DHA (Докозахексаенова киселина)  | mg     | 120    |
| - ARA (Арахидонова киселина)       | mg     | 30     |
| <b>Въглехидрати</b>                | g      | 58,1   |
| От които                           |        |        |
| - захари от които:                 | g      | 18,6   |
| - лактоза                          | g      | 18     |
| <b>GOS (галакто-олигозахариди)</b> | g      | 1,85   |
| <b>Влакнини</b>                    | g      | 1,2    |
| <b>Белтъци</b>                     | g      | 10,4   |
| <b>Сол</b>                         | g      | 0,475  |
| <b>Витамини</b>                    |        |        |
| Витамин A                          | µg RE  | 440    |
| Витамин D                          | µg     | 11,5   |
| Витамин E                          | mg     | 8,7    |
| Витамин K                          | µg     | 60     |
| Витамин C                          | mg     | 60     |
| Витамин B1 (Тиамин)                | mg     | 0,8    |
| Витамин B2 (Рибофлавин)            | mg     | 1,2    |
| Ниацин                             | mg     | 4,5    |
| Витамин B6                         | mg     | 0,5    |
| Фолиева киселина                   | µg     | 85     |
| Фолат                              | µg DFE | 150    |
| Витамин B12                        | µg     | 1,5    |
| Биотин                             | µg     | 18     |
| Пантотенова киселина               | mg     | 5      |
| <b>Минерали</b>                    |        |        |
| Натрий                             | mg     | 190    |
| Калий                              | mg     | 590    |
| Хлорид                             | mg     | 400    |
| Калций                             | mg     | 500    |
| Фосфор                             | mg     | 335    |
| Магний                             | mg     | 40     |
| Желязо                             | mg     | 5      |
| Цинк                               | mg     | 3,5    |
| Мед                                | mg     | 0,38   |
| Манган                             | mg     | 0,035  |
| Флуорид                            | mg     | <0,45  |
| Селен                              | mg     | 26     |
| Хром                               | mg     | <45    |
| Молибден                           | mg     | <45    |
| Йод                                | µg     | 95     |
| Холин                              | mg     | 170    |
| Инозитол                           | mg     | 80     |
| Таурин                             | mg     | 40     |
| L-карнитин                         | mg     | 20     |

## Съставки

Обезмаслено мляко, малтодекстрин, растителни мазнини (палмово, соево, кокосово), галакто-олигозахариди (мляко), лактоза, рибеино масло (DHA) (мляко), калциеви соли на лимонената киселина, холин битартрат, емулгатор (соев лецитин), натриев хлорид, витамини (натриев аскорбат, DL-алфа токоферол ацетат, калциев D-пантотенат, никотинамид, аскорбинова киселина, тиамин хидрохлорид, рибофлавин, ретинол ацетат, пиридоксин хидрохлорид, фолиева киселина, фитоменадион, холекалциферол, D-биотин, цианокобаламин), инозитол, железен фосфат, L-цистин, L-триптофан, калциев хлорид, калциев хлорид, млечнокисели култури (B. lactis, L. rhamnosus), масло от Mortierella alpina (ARA) (мляко), калциеви соли на ортофосфорната киселина, таурин, натриеви соли на ортофосфорната киселина, L-карнитин, магнезиев оксид, цинков сулфат, антиоксиданти (екстракт, богат на токоферол), натриев селенит, меден сулфат, калиев йодид, манганов сулфат, калиеви соли на лимонената киселина, натриеви соли на лимонената киселина.

## Инструкции за приготвяне



**МИЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ ВСЕКИ ПЪТ ПРЕДИ ПРИГОТВЯНЕТО НА ВСЯКО ХРАНЕНЕ.**



1 Стерилизирайте бебешкото шише и капачката с бибера на във вряща вода. Оставете я да ври най-малко 5 минути.



2 Преварете водата за приготвянето на храната в малък покрит съд. Оставете я да ври най-малко 5 минути.



3 Охладете водата в съда до 40 °C и я налейте в шишето.



4 С приложената в кутията мерителна лъжица, сложете препоръчания брой лъжици от млякото за кърмачета или малкото дете в шишето.



5 Затворете шишето и го разклатете добре, така че прахообразната съставка да се разтвори изцяло.



6 Охладете приготвената храна до умерена температура (37 °C) или докогато същата не е нито топла, нито студена при допир.